

如何预防人乳头瘤病毒 (HPV) :

人乳头瘤病毒(HPV)会引发九种不同类型的癌症和生殖器疣。接种HPV疫苗能够最有效地防止该病毒。

HPV疫苗可以为所有年龄段的人群提供保护，包括预防首次感染以及再度感染与HPV相关的疾病（如生殖器疣或HPV引发的癌前病变）。

对生理性别为女性的人来说，无论是否接种疫苗，定期进行宫颈检查都有助于尽早发现宫颈癌。



预防HPV引发的癌症和生殖器疣的关键步骤

- ✔ 无论年龄、性别和感情生活状况如何，我都会考虑接种HPV疫苗。
- ✔ 如果我有宫颈，我会定期检查。
- ✔ 告知我的亲朋好友接种HPV疫苗并做筛查。

详情咨询

www.hpvglobalaction.org



如何预防 HPV病毒引发的生殖器疣和九种癌症



人人都要了解人乳头瘤病毒 (HPV) !


75%以上的加拿大人在一生中都会感染某种类型的HPV病毒。

即使没有性交行为，HPV病毒也可以通过手、嘴或其他身体器官来传播，任何在下半身发生的直接皮肤接触的性行为都有可能使人们感染HPV病毒。

避孕套能有效预防性病、意外怀孕或HPV，但它并不排除直接的皮肤接触，因此不能完全防止感染HPV病毒。



HPV病毒会在以下部位引发癌变



你知道吗?

HPV病毒可以在人体内潜伏40年后再以癌症的形式出现。这意味着你现在的行为可能影响未来几年甚至几十年后的生活。

生殖器疣是什么?

- 生殖器疣是单个或几个小丘疹，通常无痛，但可能引发瘙痒或轻微出血。
- 它可能出现在腰部以下到膝盖的任何部位或口腔中。
- 从被感染到出现症状，它的潜伏期可达数月或数年。
- 即使没有表现出症状，你也可以把HPV病毒传染给别人。

