

جانیں کہ ہومن پیپلومہ وائرس (HPV) سے کیسے بچا جاسکتا ہے:

9HPV مختلف اقسام کے سرطان اور اعضاً تناصل کے مسوں (جینیٹل وارٹس) کا موجب ہے۔ HPV کی ویکسین اس وائرس سے بہترین بچاؤ کرتی ہے۔

اس سے ہر عمر کے افراد مستفید ہو سکتے ہیں۔ ویکسین کا ٹیکھ لوگوں کو وائرس کی ان تمام اقسام سے جو ان کو لاحق نہیں ہوئیں، محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص HPV سے متعلقہ بیماری (جینیٹل وارٹس یا سرطان کا ابتدائی مرحلہ) سے صحیاب ہو جائے تو ویکسین دوبارہ بیماری بونے سے بچاتی ہے۔ مزید یہ کہ، اگر آپ کی سروکس (رحم کا گردن نما حصہ) ہے تو ویکسین لگوانے سے قطع نظر، باقاعدگی سے احتیاطی معانثہ کرانے سے سروکس کے کینسر کو ابتدائی مراحل میں بی تشخیص کیا جا سکتا ہے۔

HPV سے متعلقہ سرطان اور جینیٹل وارٹس سے بچنے کیلئے اہم اقدام

HPV سے متعلقہ سرطان اور جینیٹل وارٹس سے بچنے کیلئے اہم اقدام

اگر میری سروکس موجود ہے تو مجھے احتیاطی معانثہ کروانا ہے۔

میں اپنے پیاروں سے HPV کی ویکسین لگوانے اور احتیاطی معانثہ کروانے کے بارے میں بات کروں گا۔

9 مختلف اقسام کے سرطان اور اعضاً تناصل کے مسوں سے کیسے بچا جاسکتا ہے

مزید معلومات کے لیے:

www.hpvglobalaction.org



اگر آپ ایک انسان ہیں؟ تو آپ کو بیومن پیپلومہ وائرس (HPV) کے بارے میں معلومات ہونی چاہئیں!


کینیڈا کے 75 فیصد سے زائد افراد اپنی زندگی بھر میں اس وائرس کی کسی ایک قسم سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

لوگ کمر سے نچلے حصے میں کسی بھی طریقے کے جسمانی تعلق کے ذریعے، چاہے وہ انگشت سے ہو، منہ سے ہو یا جسم کے کسی اور حصے سے ہو، اس وائرس سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسکے لیے باقاعدہ جنسی فعل ہونا ضروری نہیں ہے۔

کنڈوم جنسی بیماریوں بشمول HPV اور غیر ضروری حمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ جلد پھر بھی آپس میں چھو سکتی ہے، کنڈوم اس وائرس سے مکمل حفاظت فراہم نہیں کرتا۔



کے باعث ہونے والے چند کینسر



کیا آپ کو معلوم ہے؟

یہ وائرس کینسر کی شکل میں ظاہر ہونے سے پہلے جسم میں 40 سال تک خوابیدہ رہ سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ جو آج کر رہے ہیں اس کے اثرات سالوں یا عشرون بعد ظاہر ہو سکتے ہیں۔

جینیٹل وارٹس کیا ہیں؟

یہ چھوٹے چھوٹے گومڑ ہیں جو کہ جہنم کی صورت میں یا اکیلے ابھرتے ہیں۔ یہ عموماً تکلیف دہ نہیں ہوتے مگر خارش یا معمولی بلیڈنگ کر سکتے ہیں۔

یہ کمر سے گھٹنوں تک، دھڑ کے اگلے اور پچھلے حصے پر اور منہ میں کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں۔

وائرس سے متاثر ہونے کے باوجود ان گومڑوں کو ظاہر ہونے میں مہینوں سے سال لگ سکتے ہیں۔

جینیٹل وارٹس کی ظاہری علامات نہ ہونے کے باوجود بھی آپ وائرس کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔

